


顯花植物ト見違ヘル羊齒

*Coniocybe luteum* Y. ASAHINA, nov. sp.

ト命名シタ、產地ハ小笠原島母島ノ乳房山デアル(歐文欄ノ圖ヲ參照スベシ)

○顯花植物ト見違ヘル羊齒

緒 方 正 資



*Hemionitis palmata* L.

隱花植物デ  
 アリナガラ  
 顯花植物ノ  
 様ナ外形ヲ  
 持ツモノハ  
 間々アルコ  
 トデ殊ニ羊  
 齒ノ内ニハ  
 一寸見ルト  
 コレガ羊齒  
 トハ思ハレ  
 シモノモ少  
 クナイ、彼  
 ノ園藝植物  
 ノ一トシテ




*Christensenia aesculifolia* MAX. 瓜哇バイテンツォルグ植物園栽培品 (緒方正資撮影)


利用サル、  
Strawberry  
fernノ如キ  
ハ其一例デ  
アル、本植  
物ハ Hemi-  
onitis pal-  
mata L. ト  
云フモノデ  
南米、メキ  
シコ等ニ産  
スル、其囊  
堆ノ形狀デ  
モ推察サル  
、通り吾邦  
ノいはがね  
さうニ近似  
ノモノデ其  
掌狀ヲナシ

顯花植物ト見違ヘル羊齒


タ葉ハ正ニあらんだいちごニ彷彿タルモノデア  
更ニ著シキ例ハ印度アッサム地方カラ東印度群島、フキリッピンヘカケテ産スル羊齒 *Christensenia aesculi-*



*Christensenia aesculifolia* MAX. 胞子囊堆ノ着生状態  
(薔軒撮影)



*Christensenia aesculifolia* MAX.  
ノ囊堆(Pflanzen-Famil. = ヨル)



*Christensenia aesculifolia*  
MAX. 囊堆ノ縦斷  
(Pflanzen-Famil. = ヨル)

*folia* MAX. (= *Kaulfussia aesculifolia* Bl.) ノソレデア  
此羊齒ハ匍匐莖ヲ有シ二列ニ葉ヲ生ジ葉柄ハ長サ三〇cm位デ托葉ガアル、葉面ハ三―五裂シ一見七葉樹ノ様デ

にほひらん (*Haraella odorata* Kudo.)

アルノデ其種名ガ起テ居ル、羽狀ノ葉脈ガ射出シテ居ル有様ハ羊齒トハ一寸思ヘナイ、所屬ハりうびんたい科  
 デアルノデ其胞子囊叢モ一風變テ居テ所謂 *Synangia* ガ側脈ト側脈トノ間ニ不規則ナ二列ヲナシテ網目ノ交叉  
 點ニ着生スル、此一ツノ「シナンギウム」ハ略圓盤形デ十數箇ノ室ガ菊座形ヲナシテ排列シ各室ノ頂部ニ孔ガア  
 ッテ胞子ヲ吐ク様ニナッテ居ル

## ○臺灣蘭科植物譜

正 宗 嚴 敬

蘭科植物ハ顯花植物中デ最モ種類ノ多イ者デアッテ全  
 世界ニ産スル品種ハ三萬種ヲ下ラナイ、其ノ中本邦ニ  
 産スル者ハ四五百種デアルカラ餘リ大イ方デハナイ、  
 此ノ科ノ者ハ其ノ花ノ形態及ビ其ノ葉ノ様子ガ優美ナ  
 ノデ園藝品トシテノ大イニ價値ガアルノデ此ノ方面デ  
 非常ニ珍重サレテ居ル、今此處ニ本誌ノ餘白ヲ借リテ  
 其ノ寫眞ニ簡單ナ説明ヲ加ヘテ出ス事ニシタ

### 一、にほひらん (*Haraella odorata* Kudo.)

臺灣北部ノ照葉樹林中ニ産スル着生蘭デアルガ、ソウ  
 ヤタラニアル者デハナイ、莖ハ短ク、葉ハ二列デ密生  
 シ倒披針狀鎌形デ葉脈ヨリ可ナリ長イ花序ヲ出シテ一  
 乃至二花ヲ着ケル、花ハまつらん屬 (*Gastrochilus*) ニ